


581,5
0-92

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА ЕКОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ НАУК
КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
УКРАЇНСЬКЕ БОТАНІЧНЕ ТОВАРИСТВО
КРИВОРІЗЬКИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР

ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ: ЕКОЛОГІЧНІ, ОСВІТЯНСЬКІ МЕДИЧНІ, АСПЕКТИ

*Матеріали III Всеукраїнської конференції:
8-9 грудня 1998 року, м. Кривий Ріг*

1 частина



Кривий Ріг — 1998

ОСТРОВНАЯ ПОПУЛЯЦИЯ КУРГАННИКА НА УКРАИНЕ: ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ

Стригунов В.И.

Анализ литературных данных и наших гнездовых находок в 1980-1981 гг. позволил предположить существование островной популяции курганника в лесостепи Украины, в пределах Кировоградской, Черкасской и, вероятно, Полтавской обл. (Стригунов, 1982). В 1982 г. нами найдено 2 новых гнезда, одно в окр. с. Ставидла Александровского р-на Кировоградской обл. и другое в окр. с. Великая Буромка Чернобаевского р-на черкасской обл. Таким образом, в настоящее время известно 3 гнезда и одно место возможного гнездования курганника в южных районах лесостепи. Более или менее сплошной ареал вида расположен в 450-550 км от островной популяции, в низовьях Дона. Разрыв, по-видимому, обусловлен высокой степенью освоенности территории Донецкого края.

Гнездовые находки курганника в конце XIX и начале XX ст. в бывших Херсонской, Харьковской, Полтавской и Киевской губ. (Пачосский, 1909; Сомов, 1897; Зарудный, 1911; Шарлеман, 1914) свидетельствуют о том, что в прошлом ареал курганника на Украине охватывал степь и юг лесостепи. В дальнейшем, в связи с интенсивным освоением степной зоны, ареал резко сократился и все находки относятся только к лесостепной зоне.

По нашему мнению, современная островная популяция курганника - это часть бывшего ареала вида. И сохранился он в лесостепи благодаря тому, что приспособился к гнездованию на деревьях. Все гнезда, найденные в прошлом и нами, размещались на деревьях. Очевидно, в силу этого обстоятельства распашка и освоение целинных земель в лесостепи затронула курганника в меньшей мере, чем в степной зоне, где измененными оказались не только кормовые, но и гнездовые биотопы.

Вполне возможны и другие пути формирования островной популяции курганника на Украине:

- вытеснение вида из освоенных районов степи в лесостепь;
- расширение основного ареала вида.

Однако, в первом случае, более вероятно, что птицы откочевывали в менее затронутые человеком восточные районы степной зоны европейской части СССР. Не исключено, что небольшая их часть пополняла и популяцию в лесостепи Украины. Второе предположение не подтверждается находками курганника на гнездовании в Донецкой, Ворошиловоградской и др. обл., которые расположены между островной популяцией и основным ареалом вида. При современном расширении ареала курганника вряд ли возможен столь большой разрыв.