

Щорічник українського ботанічного товариства № 1. – Київ: Вид-во АН УРСР,  
1959. – 88 с.

Добровольський І. А. Матеріали до бріюфлори штучних лісонасаджень  
Криворіжжя і прилеглих районів / І. А. Добровольський, Н. В. Гаєва  
// Щорічник українського ботанічного товариства № 1. – Київ, 1959. – С. 27.

І. А. Добровольський Н. В. Гаєва  
МАТЕРІАЛИ ДО БРІЮФЛОРИ ШТУЧНИХ ЛІСОНАСАДЖЕНЬ КРИВОРІЖЖЯ І  
ПРИЛЕГЛИХ РАЙОНІВ

(Прочитано на засіданні Криворізької групи УБТ 23.XII 1957 р.)

Бріюфлора штучних степових лісових насаджень правобережного Степу УРСР вивчена недостатньо.

Попередня і неповна обробка мохів, зібраних кафедрою ботаніки Криворізького педінституту в лісових масивах і смугах Криворіжжя і прилеглих районів, показує значну їх різноманітність.

Виявлено понад 20 видів мохів, серед яких політрихових–2, потійових–3, гримійових–1, ортотрихових–1, брійових–3, амблістегійових–1, гіпнобрійових–9, маршанційових–2. В штучних насадженнях переважають гіпнобрійові мохи, за ними йдуть потійові, брійові.

Близько 15 видів мохів спостерігається в лісонасадженнях, що ростуть у заплавах і близьких до них за зволоженням місцях. Найбільш характерними для цих лісонасаджень є такі види мохів: *Leskea polycarpa* (E h r h) H edw., *Potaisia polyantha* (S c h r e d), *Brachythecium salebrosum* (W e b. et Mohr.), *Hypnum pallascens* (H e d w.) P. V., *Hypnum cupressiforme* H e d w., *Mnium cuspidatum* H e d. i in.

Виявлення *Hypnum pallascens* (H e d w.) P. V. на Криворіжжі має науковий інтерес. Значне поширення в різних типах посадок мають такі бур'янові мохи: *Ceratodon purpureus* (H e d w) Brid., *Bryum capillare* L., *B. caespiticium* L., *Homalothecium sericeum* (H e d w). Далше вивчення бріюфлори штучних посадок Криворіжжя повинно бути спрямовано на уточнення різноманітності і особливостей її в різних типах деревних насаджень.

Автори висловлюють подяку Г. Ф. Бачуриній за допомогу при виконанні даної роботи.