



Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758)

Галагаз
(Пеганка)



Таксономічна належність

Клас – Aves – Птахи – Птицы. Ряд – Anseriformes – Гусеподібні – Гусяобразные. Родина – Anatidae – Качкові – Утиные.

Природоохоронний статус

З (рідкісний). МСОП – LC.

Ареал виду, поширення в області

Поширений у степовій і пустельній зонах від Британських островів і Скандинавії до Японії – на півночі, на півдні – від Південної Європи до Тибету, Монголії і Північного Китаю. В Україні поширений в приморських районах, зрідка залитає в інші регіони. У Дніпропетровській області зрідка гніздиться в Широківському, Новомосковському районах, літує у Павлоградському, Новомосковському, Магдалинівському, Дніпропетровському,

Апостолівському, Широківському районах.

Біоекологічна характеристика

Значно більший за свійську качку. Розмах крил 1100–1330 мм. Вага 900–1650 г. Літуючий, спорадично гніздовий вид. Активний вдень. Трапляється з березня по жовтень. В області тrimається солонуватих водойм. Трапляється на озерах і лиманах річок Самара й Оріль, солонцюватих та солоних озерах і відстійниках в басейні річки Інгулець. Живиться на воді та на суші як рослинною, так і тваринною їжею. Моногам. Починає

гніздуватися в квітні. Гнізи роблять у норах лисиць, борсуків, розщелинах берегів, кар'єрів, відвала, іноді за 1–1,5 км від берега водойми.

Наукове та практичне значення

Мисливський птах, має цінний пух.

Чисельність і причини її зміни

На літуванні трапляється від 1 до 3–5 особин. З 1950-х років його чисельність різко зменшилась і почала зростати з кінця 1970-х – початку 1980-х років. В Широківському районі гніздиться з 2001 року 1–4 пари, 1 випадок гніздування зареєстрований в Новомосковському районі.

Причини зміни чисельності

Браконьєрство, зростання чисельності лисиць.

Заходи охорони

На території області не впроваджувалися.

Основні джерела інформації

Коцюруба, Тарутін, 2003; Сижко, 2007; Булахов та ін., 2008; особисті повідомлення Бредбієра П. В., Пономаренка О. Л.



Автор: Коцюруба В. В.
Фото: Коцюруба В. В.